

Section 8 Outils de dépistage

Outils de dépistage et programmes utilisés en Ontario

À considérer avant de procéder à l'examen de dépistage

Avant d'utiliser un outil de dépistage, tous les professionnels devraient répondre aux questions suivantes :

- ◆ Êtes-vous qualifié pour procéder à un tel examen?
- ◆ Savez-vous comment faire le suivi après l'examen si vous avez décelé un problème?
- ◆ Quel niveau de confidentialité respecterez-vous par rapport à l'examen? Comment assurerez-vous ce niveau de confidentialité?
- ◆ Où et quand aura lieu l'examen?
- ◆ Devez-vous tenir compte de l'aspect culturel lorsque vous faites l'examen? Voir à ce sujet la Section 2 et la Section 6 du présent guide.
- ◆ Savez-vous comment discuter avec la famille des questions délicates relatives à l'utilisation de l'outil de dépistage et à la communication des résultats de l'examen? Voir la Section 6 du Guide.
- ◆ L'outil de dépistage est-il fiable, exact et valide?
- ◆ Est-il impartial et non discriminatoire?
- ◆ Est-il facile à utiliser?
- ◆ Est-il économique?



Quel que ce soit le résultat de l'examen de dépistage, il importe d'aider les enfants et leur famille à obtenir le soutien, les ressources et les renseignements communautaires appropriés.

Veuillez prendre note que certains des outils dans la liste ci-dessous sont réservés à l'usage exclusif des professionnels ayant les qualifications et la formation appropriées.

Section 8 Outils de dépistage

Outil	Objectif	Tranche d'âge	Description générale
<p>AIMS - Alberta Infant Motor Scale</p> <p>En anglais seulement.</p>	<p>Développement moteur</p>	<p>Bébés - de 4 à 18 mois</p>	<p>Détermination des retards de motricité dans quatre positions : couchée, ventrale, assise et debout.</p>
<p>ASQ - Questionnaire - âge et étape®</p> <p>Disponible en français, en anglais et, pour certaines tranches d'âge, en coréen.</p>	<p>Communication Motricité globale Motricité fine Résolution de problèmes Aptitudes individuelles ou sociales</p>	<p>De 1 mois à 5 ½ ans</p>	<p>Le formulaire peut servir à remplir deux objectifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ cibler les nourrissons qui pourraient avoir besoin d'une évaluation plus approfondie; ◆ surveiller le développement des enfants à risque de souffrir d'une déficience ou d'un retard sur le plan développemental.
<p>Programme d'intervention précoce auprès des enfants aveugles ou ayant une basse vision</p>	<p>Vision</p>	<p>De la naissance à la première année d'école</p>	<p>Déceler tout enfant qui ne franchit pas les étapes clés du développement de la vision puis le diriger vers un médecin ou un optométriste pour une évaluation plus approfondie avant l'âge d'un an. Dans le cas où on soupçonne un problème de vision, il importe de faire un renvoi à un spécialiste le plus rapidement possible.</p>
<p>www.children.gov.on.ca/French/documents/topics/earlychildhood/vision_services.pdf</p>			
<p>CHAT - Liste de contrôle liée à la détection de l'autisme chez les tout-petits</p> <p>En anglais seulement.</p>	<p>Troubles du spectre autistique</p>	<p>De 18 à 24 mois</p>	<p>Cibler les enfants qui risquent d'être atteints de troubles du spectre autistique.</p> <p>Si on cible un enfant comme étant à risque à l'aide d'une des deux listes de contrôle, il importe de faire un renvoi aux Services d'intervention précoce pour les troubles de la parole et du langage chez les enfants d'âge préscolaire.</p>
<p>www.autismcanada.org/pdfs/chatscreeningtool.pdf</p>			

Section 8 Outils de dépistage

Outil	Objectif	Tranche d'âge	Description générale
<p>M-CHAT - Liste de contrôle modifiée liée à la détection de l'autisme chez les tout-petits</p> <p>Disponible en anglais et en espagnol.</p>	Troubles du spectre autistique	De 16 à 30 mois	<p>Cibler les enfants qui risquent d'être atteints de troubles du spectre autistique.</p> <p>Si on cible un enfant comme étant à risque à l'aide d'une des deux listes de contrôle, il importe de faire un renvoi aux Services d'intervention précoce pour les troubles de la parole et du langage chez les enfants d'âge préscolaire.</p>
www.firstsigns.org/downloads/m-chat.PDF			
<p>Liste de contrôle des aptitudes liées à la communication</p> <p>Disponible en français, en anglais et en 16 autres langues.</p>	Langage et communication	De 6 mois à 4 ans	<p>Liste de contrôle élaborée par le Toronto Public Health Speech and Language Services (services d'orthophonie pour les enfants d'âge préscolaire de la ville de Toronto). Cette liste aide les parents et les personnes chargées de subvenir aux besoins d'un enfant à évaluer si ce dernier a besoin de services d'orthophonie.</p>
www.tpsls.on.ca/psl/pdf/french_checklist.pdf			
Dépistage dentaire	Santé buccale et dentaire	De 18 à 36 mois	Évaluation visuelle faite par une hygiéniste dentaire pour repérer un problème flagrant et pour cibler les enfants à risque d'avoir des caries dentaires en bas âge.
<p>Outil de dépistage dentaire</p> <p>En anglais seulement.</p>	Santé buccale et dentaire	De 18 à 36 mois	Repérage précoce des enfants à risque d'avoir des caries dentaires en bas âge. Permet de surveiller la dentition des enfants. Offre également des conseils sur l'hygiène et les soins dentaires.
<p>Programme de dépistage néonatal des troubles auditifs et d'intervention précoce</p>	<p>Ouïe</p> <p>Émissions oto-acoustiques automatisées (EOA)</p> <p>Potentiel évoqué auditif automatisé du tronc cérébral (PEAATC)</p>	De la naissance à 4 mois	<p>Déceler un problème d'ouïe important chez les nouveau-nés et les nourrissons. Lors du deuxième dépistage, si les résultats s'inscrivent dans la colonne « renvoi », on doit soumettre le cas du bébé (sans frais) au service d'audiologie pour obtenir un diagnostic.</p>
www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/earlychildhood/hearing/index.aspx			

Section 8 Outils de dépistage

Outil	Objectif	Tranche d'âge	Description générale
E.R.I.K. - Early Referral Identification Kit En anglais seulement.	Parole, langage et alphabétisme chez les jeunes enfants (centre moteur de la parole, articulation, bégaiement et troubles de la voix ou de la parole) Motricité globale et fine Aptitudes cognitives Aptitudes sociales Habilité à manger Développement sensoriel	De 6 mois à 4 ans	Outil de dépistage développemental pour cibler le plus rapidement possible les enfants à risque de retards de développement. Si on identifie un enfant à risque, on doit faire un renvoi au Service d'intervention précoce pour les troubles de la parole et du langage chez les enfants d'âge préscolaire et à d'autres services au besoin.
Échelle de dépression post-partum d'Edimbourg	Troubles de l'humeur post-partum ou Dépression pendant la grossesse	Mères avant et après la naissance, pères, parents adoptifs et parents de tout-petits.	Échelle utilisée surtout pour cibler les femmes qui souffrent de dépression post-partum et d'angoisse et de dépression pendant la grossesse.
www.beyond-words.org/erik.htm			
www.lavieavecunnouveaubebe.ca/resources/EPDS_checklist_fr.pdf			

Section 8 Outils de dépistage

Outil	Objectif	Tranche d'âge	Description générale
Questionnaire de dépistage Nipissing (NDDS) En français, en anglais et en d'autres langues.	Aptitudes cognitives Communication, parole et langage Motricité globale et fine Ouïe Aptitudes sociales et affectives Autonomie Vision	D'un mois à six ans	Liste de contrôle universelle destinée aux parents pour dépister les problèmes de vision, d'ouïe, de communication, de motricité globale et fine, d'aptitudes cognitives, sociales et affectives et d'autonomie. L'outil fournit aux parents et aux professionnels de la santé et de puériculture un moyen pratique et convivial de suivre le progrès des bébés et des enfants d'un groupe d'âge donné. Le dépistage correspond au calendrier d'immunisation et aux étapes clés du développement jusqu'à l'âge de six ans. Il s'agit de l'outil le plus utilisé lors de la visite liée au bilan de santé amélioré à 18 mois. Le questionnaire est assorti d'activités appropriées à l'âge qui favorisent le développement global.
www.ndds.ca/language-fr.php			
Programme de dépistage néonatal de l'Ontario Feuillets de renseignements disponibles en français, en anglais et en d'autres langues.	Santé, avec l'utilisation de l'outil de dépistage néonatal	De 1 à 7 jours	Le Programme de dépistage néonatal de l'Ontario (PDNO) offre le meilleur outil de dépistage de maladies graves chez tous les bébés nés en Ontario. Un dépistage précoce de ces maladies permet de traiter le bébé pour éviter des problèmes de croissance et de santé, le retard mental et le syndrome de la mort subite du nourrisson. À l'heure actuelle, cet outil permet de détecter 25 maladies. Consultez le site Web pour obtenir de plus amples informations.
www.newbornscreening.on.ca			

Section 8 Outils de dépistage

Outil	Objectif	Tranche d'âge	Description générale
<p>NutriSTEP® - Outil de dépistage de problème de nutrition chez les enfants d'âge préscolaire</p> <p>Disponible en français, en anglais et en d'autres langues.</p>	<p>Nutrition, alimentation et déglutition</p>	<p>De 3 à 5 ans</p>	<p>Outil servant à dépister les enfants d'âge préscolaire qui courent le risque d'avoir des problèmes d'alimentation. On traite, entre autres, de l'apport alimentaire et des nutriments; de la croissance physique; des capacités développementales et physiques; de l'alimentation familiale et des préférences alimentaires; des préoccupations des parents; des connaissances, croyances et pratiques alimentaires; de la sécurité alimentaire et de l'influence du milieu dans lequel on nourrit les bébés. On recommande aux parents d'enfants à risque de consulter une diététiste ou leur médecin de famille.</p>
<p>www.rourkebabyrecord.ca</p>			
<p>Outil de dépistage des troubles post-partum Parkyn du programme Bébés en santé, enfants en santé</p> <p>Disponible en français et en anglais.</p>	<p>Facteurs développementaux</p> <p>Maladies congénitales ou acquises</p> <p>Santé familiale et facteurs sociaux</p>	<p>Mères et nourrissons</p>	<p>Dans le cadre du Programme Bébés en santé, enfants en santé, on effectue le dépistage des facteurs de risque chez les nourrissons et leur famille associés au développement inadéquat de l'enfant. Une infirmière de la santé publique peut faire un suivi et procéder à une évaluation plus approfondie. L'objectif du dépistage est de cibler les familles qui pourraient bénéficier de services à domicile plus complets.</p>
<p>REEL-3 - Receptive, Expressive, Emergent Language Test</p> <p>En anglais seulement</p>	<p>Langage</p>	<p>De la naissance à trois ans</p>	<p>Dépistage du langage réceptif (la compréhension de l'enfant) et du langage expressif (la communication verbale de l'enfant).</p>

Section 8 Outils de dépistage

Outil	Objectif	Tranche d'âge	Description générale
<p>Relevé postnatal Rourke</p> <p>Disponible en français et en anglais.</p>	Santé et développement	De la naissance à 5 ans	<p>Outil de dépistage utilisé par les médecins de famille et les pédiatres pour évaluer le développement de l'enfant. Créé en 1979, cet outil a fait l'objet d'une révision en 2009. Il contient des données probantes liées aux paramètres de croissance et de développement. Il favorise l'éducation des parents (ou de la personne prenant soin de l'enfant) par le médecin.</p> <p>www.cps.ca/francais/enonces/cp/rourke.htm</p>
<p>RUCS - Routine Universal Comprehensive Screening Research</p> <p>En anglais seulement.</p>	Maltraitance des femmes	Toutes les femmes	<p>À l'aide de cette approche universelle et globale, on évite de stigmatiser les femmes maltraitées. RUCS est efficace pour détecter les cas de maltraitance et permettre d'intervenir de façon précoce.</p>